

## **Violencia de pareja íntima en las poblaciones transgénero: revisión sistemática y meta-análisis de prevalencia y correlaciones**

Sarah M. Peitzmeier, PhD, MSPH, Mannat Malik, MHS, Shanna K. Kattari, PhD, Elliot Marrow, AB, Rob Stephenson, PhD, Madina Agénor, ScD, MPH, and Sari L. Reisner, ScD

Peitzmeier, S. M., Malik, M., Kattari, S. K., Marrow, E., Stephenson, R., Agénor, M., & Reisner, S. L. (2020). Intimate partner violence in transgender populations: systematic review and meta-analysis of prevalence and correlates. *American journal of public health, 110*(9), e1-e14.

<https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2020.305774>

**Contexto:** Individuos transgéneros experimentan vulnerabilidades particulares a la violencia de pareja íntima (VPI) y pueden experimentar una carga desproporcionada de VPI en comparación a individuos cisgéneros (no transgéneros).

**Objetivos:** Revisar sistemáticamente la literatura cuantitativa sobre la prevalencia y las correlaciones de VPI en poblaciones transgénero.

**Método de búsqueda:** Las/los autores investigaron bases de datos (PubMed, CINAHL), literatura gris (Google), índices de revistas académicas, y resúmenes de conferencias, y consultaron expertos en el sector. Los autores fueron contactados con solicitudes de datos de casos e investigaciones en que fueron inscritos participantes transgeneros, pero se proporcionaron datos estadísticos desglosados para esta población.

**Criterios de selección:** Incluimos toda la literatura cuantitativa publicada antes de junio 2019 sobre la prevalencia y las correlaciones de la victimización, perpetración, o uso de servicios de VPI en poblaciones transgénero. No había restricciones en cuanto tamaño de la muestra, año, o ubicación.

**Colección y análisis de datos:** Dos revisores independientes realizaron la investigación. Un revisor realizó la extracción usando una base de datos estructurada, y otro revisor la comprobó para detectar errores u omisiones. Utilizamos un meta-análisis de efectos aleatorios para calcular riesgos relativos (RRs) comparando la prevalencia de VPI en individuos transgéneros y individuos cisgéneros en estudios donde ambos fueron inscritos. También usamos meta-análisis para comparar la prevalencia de VPI en individuos transgéneros asignados sexo femenino al nacer y individuos transgéneros asignados sexo masculino al nacer, y para comparar la prevalencia de VPI física entre personas de genero no binario y individuos trans binarios en estudios que inscribieron ambos grupos.

**Resultados Principales:** Identificamos 85 artículos de 74 conjuntos de datos independientes ( $n_{\text{total}} = 49,966$  participantes transgéneros). En los estudios que lo comunicaron, la prevalencia mediana de VPI física durante el periodo de vida era 37.5%, VPI sexual durante del periodo de vida era 25.0%, VPI física en el último año era 16.7%, y VPI sexual en el último año era 10.8% entre individuos transgéneros. En comparación a individuos cisgéneros, individuos transgéneros eran 1.7 veces más propensos a sufrir cualquier tipo de VPI (RR = 1.66; 95% intervalo de confianza [IC] = 1.36, 2.03), 2.2 veces mas propensos a sufrir VPI física (RR = 2.19; 95% CI = 1.66, 2.88), y 2.5 veces mas propensos a sufrir VPI sexual (RR = 2.46; 95% CI

= 1.64, 3.69). Disparidades persistieron en la comparación específica a mujeres cisgénero. No había una diferencia significativa en VPI general, VPI física, o VPI sexual entre individuos transgéneros asignados sexo femenino al nacer y individuos transgéneros asignados sexo masculino al nacer, ni en la prevalencia de VPI física entre individuos transgéneros binarios y individuos transgéneros no binarios. Victimización por VPI aparece asociada con riesgo sexual, uso de sustancias, y cargas de salud mental en poblaciones transgénero.

**Conclusiones de las/los autores:** Individuos transgéneros experimentan una prevalencia de victimización por VPI dramáticamente más alta en comparación a individuos cisgéneros, independientemente del sexo asignado al nacer. Estimaciones de la prevalencia de VPI son comparativamente altas para individuos transgéneros asignados sexo femenino al nacer y individuos transgéneros asignados sexo masculino al nacer, y para individuos transgénero binarios y no binarios, aunque es necesario realizar más investigaciones.

**Implicaciones para la salud pública:** Se necesitan con urgencia intervenciones basadas en datos empíricos para prevenir y abordar VPI en esta población de alto riesgo con necesidades únicas. La falta de protecciones legales contra la discriminación en el empleo, acceso a vivienda, y servicios sociales muy probablemente fomentan la vulnerabilidad a VPI. Individuos transgéneros deberían estar explícitamente incluidos en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EEUU (US Preventative Services Task Force) para promover revisiones de VPI en entornos de atención primaria. Se necesitan también intervenciones políticas, interpersonales e individuales, para abordar los niveles epidémicos de VPI en esta grupo marginado y de alto riesgo. (*Am J Public Health*. Publicado en línea el 16 de julio antes de la edición impresa: e1–e14. doi:10.2105/AJPH.2020.305774)

**Resumen en lenguaje sencillo:** La violencia de pareja íntima (VPI) es un tema de salud pública serio que puede resultar en daños físicos, enfermedades mentales, y incluso homicidio. Se ha prestado menos atención a VPI en individuos transgéneros, cuyo género se diferencia del sexo que fueron asignados al nacer. Buscamos estudios existentes sobre la prevalencia y correlaciones de la victimización, perpetración, o uso de servicios de VPI en poblaciones transgénero. Encontramos 85 artículos relevantes. Individuos transgéneros se enfrentan a altos índices de VPI: en promedio, entre los estudios, 1 en 6 individuos transgéneros relataron VPI física, y 1 en 10 relataron VPI sexual en el último año. Personas transgéneros eran 2.2 veces más probables de sufrir VPI física y 2.5 veces más probables de sufrir VPI sexual en comparación a individuos cisgéneros reclutados en el mismo estudio. Victimización por VPI fue asociado con peor salud sexual, salud mental, y resultados de abuso de sustancias en individuos transgéneros, señalando VPI como una agente potencial de disparidades en salud. Este estudio sugiere que los individuos transgéneros deberían ser incluidos de forma significativa en programas de evaluación de VPI, y que se tiene que mejorar y aumentar el acceso a recursos como refugios para sobrevivientes de violencia doméstica. Investigaciones futuras deberían examinar intervenciones de prevención en esta población que está desproporcionadamente afectado por la violencia.